

Antibioprophylaxie (ABP) pour la chirurgie bariatrique et chez l'obèse (IMC > 35kg/m²)

Acte chirurgical	Produit	Dose initiale	Ré-injection et durée
Mise en place d'un anneau gastrique	Céfazoline *	2 g (perfusion 30 min)	Dose unique (si durée > à 4h, réinjecter 1 g)
	Céfuroxime *	1,5 g (perfusion 30 min)	Dose unique (si durée > à 2h, réinjecter 0,75 g)
	Allergie : Vancomycine**	30 mg/kg à la vitesse de 1000 mg/heure (dose calculée sur le poids réel)	Dose unique
Réalisation d'un court circuit gastrique ou d'une « sleeve » gastrectomie	Cefuroxime	1,5g en IV lente	Dose unique (si durée > 2 h réinjecter 0.75g)
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	1 200 mg IV lente 6-7 mg/kg/j	Dose unique Dose unique
Chirurgie de réduction du tablier abdominal, abdominoplastie (dermolipectomie)...	Céfazoline *	2 g (perfusion 30 min)	Dose unique (si durée > 4h, réinjecter 1 g)
	Céfuroxime *	1,5 g (perfusion 30 min)	Dose unique (si durée > 2h, réinjecter 0,75 g)
	Allergie : Clindamycine - Gentamicine	1 200 mg IV lente 6-7 mg/kg/j	Dose unique Dose unique