

Antibioprophylaxie (ABP) en chirurgie gynécologique et en obstétrique

Acte chirurgical	Molécule	Dose initiale	Posologie et durée
Hystérectomie (voie haute ou basse) Coeliochirurgie	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique (si durée >4h réinjecter 1g)
	Céfuroxime	1.5 g IV lente	Dose unique (si durée >2h réinjecter 0.75g)
	Allergie : Clindamycine	900 mg	Dose unique
	+		
	Gentamicine	6-7 mg/kg/j	Dose unique
Coelioscopie diagnostique ou exploratrice sans incision vaginale ou digestive	Pas d'ABP		
Hystéroscopie			
Hystérosalpingographie			
Biopsie endométriale			
Fécondation <i>in vitro</i>			
Pose d'un dispositif intra-utérin			
Tumorectomie mammaire simple			
Interruption volontaire de grossesse			
Césarienne	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique après clampage du cordon
	Allergie : Clindamycine	900 mg	
Mastectomie Reconstruction et/ou plastie mammaire	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique (1g si durée >4h)
	Allergie : Clindamycine	900 mg	Dose unique
	+		
	Gentamicine	6-7 mg/kg/j	Dose unique
Prolapsus (toute voie d'abord)	Amoxicilline + Ac. clavulanique	2 g IV lente	Dose unique (réinjecter 1g si > 2h)
	Allergie : Métronidazole	1g	Dose unique
	+		
	Gentamicine	6-7 mg/kg/j	Dose unique