

Antibioprophylaxie (ABP) en chirurgie ORL

Acte chirurgical	Molécule	Dose initiale	Posologie et durée
Chirurgie endoscopique endonasale avec ou sans méchage	Céfazoline	2 g IV lente	Dose unique
	Ou Amoxicilline + Ac. clavulanique	2 g IV lente	Dose unique
	Allergie : Clindamycine	900 mg	Ré -injection de 600 mg si durée > 4h puis 600 mg /6h
	+ Gentamicine	6-7 mg/kg/j	Dose unique
Chirurgie cervico-faciale avec ouverture bucco-pharyngée	Amoxicilline + Ac. clavulanique	2 g IV lente	Réinjection de 1 g / 2 h en période peropératoire puis 1 g /6 h pendant 24h
	Allergie : Clindamycine	900 mg	Réinjection de 600 mg si durée > 4h puis 600 mg /6h pendant 24h
	+ Gentamicine	6-7 mg/kg/j	Dose unique
Chirurgie Thyroïdienne et parathyroïdienne	Pas d'ABP		
Chirurgie de l'étrier, de l'oreille moyenne et implantation cochléaire			
Chirurgie des glandes salivaires			
Cervicotomie			
Curage ganglionnaire			
Amygdalectomie, Adénoïdectomie			
Chirurgie vélopalatine			
Laryngo-trachéo-bronchoscopie et oesophagoscopie			
Trachéotomie			
Chirurgie naso-sinusienne avec méchage	Amoxicilline + Ac. clavulanique	2 g IV lente	Réinjection de 1 g / 2h en période peropératoire puis 1 g / 6 h pendant 24h
	Allergie : Clindamycine	900 mg	Réinjection de 600 mg si durée > 4h puis 600 mg /6h pendant 24h
	+ gentamicine	6-7 mg/kg/j	Dose unique