

## Prophylaxie de l'endocardite infectieuse

***Cardiopathies à haut risque d'endocardite pour lesquelles une prophylaxie est recommandée.***

**L'antibioprophylaxie ne doit être envisagée que pour ces cardiopathies.**

- Valve prothétique ou matériel prothétique utilisé pour une réparation valvulaire.
- Antécédent d'endocardite infectieuse.
- Cardiopathie congénitale :
  - *Cyanogène non opérée, ou avec une fuite résiduelle, ou mise en place d'une dérivation chirurgicale.*
  - *Cardiopathie congénitale avec réparation prothétique, placée chirurgicalement ou percutanée, jusqu'à 6 mois après la mise en place.*
  - *Avec une fuite résiduelle au site d'implantation d'un matériel prothétique, mise en place chirurgicalement ou par voie percutanée.*

***Recommandations pour la prophylaxie chez les patients à haut risque, en fonction du type de procédure***

- LA SEULE INDICATION à la prophylaxie de l'endocardite est en chirurgie dentaire : si intervention gingivale ou de la région péri-apicale de la dent, ou manipulation de la muqueuse orale.

Antibiotiques (30-60 min avant la procédure)			
Situation	Antibiotique	Adultes	Enfants
Pas d'allergie aux bêtalactamines	Amoxicilline ou Ampicilline	2g per os ou IV	50mg/kg per os ou IV
Allergie aux bêtalactamines	Clindamycine	600mg per os ou IV	20mg/kg per os ou IV
	Ou Azithromycine	500 mg per os	20 mg/Kg per os
	Ou Clarithromycine	15 mg/Kg per os	7,5 mg/Kg per os