

Antibioprophylaxie en radiologie et médecine interventionnelle

Acte chirurgical	Molécule	Dose initiale	Posologie et durée
Embolisation (artérielle, tumorale)	Pas d'ABP		
Shunt porto-systémique intra-hépatique trans-jugulaire	Pas d'ABP		
Drainage biliaire pour obstruction cancéreuse ou bénigne ou lithiase	Pas d'ABP		
Néphrostomie simple	Pas d'ABP		
Gastrostomie endoscopique, scléroses de varices oesophagiennes	Amoxicilline + Ac. clavulanique Allergie : Clindamycine + Gentamicine	2 g IV lente 900mg 6-7 mg/kg/j	Dose unique Dose unique Dose unique
Ponction sous écho-endoscopie (sauf ponction trans-colorectale)	Pas d'ABP		
Dilatation endoscopique prothèse digestive, Laser			
Coagulation au plasma argon			
Chimio-embolisation *			
Radio fréquence *			
Micro ondes *			
Cathéter et chambre implantable	Pas d'ABP		
Angiographie, angioplastie			
Endoprothèse, stent(sauf intra-coronaire)	Céfazoline Allergie : Vancomycine	2 g IV lente 30mg/kg/60min	Dose unique (1g si durée >4h) Dose unique